Le boson de HIGGS!

Quel est le problème ?

En l'état actuel de nos connaissances,
37 particules élémentaires sont les constituants ultimes
de notre Univers.

A l'exception de 2, elles ont chacune une masse.

Si elles ne possédaient pas une masse:
la matière ne serait pas structurée.

Nous n'existerions pas !

Mais d'après le SM
les particules ne devraient pas
avoir de masse !

Quelle est l'origine de la masse ?

Epopée scientifique et humaine à l'échelle mondiale
depuis près de 50 ans ... pas encore complètement
terminée.

L'état des lieux

- L'époque des théoriciens

Retour en arrière: 1964

- L'époque des expérimentateurs

Une quête de 48 années

Retour en arrière: 1964

P. W. Anderson
Prix Nobel 1977

Y. Nambu
Prix Nobel 2008

J. Goldstone

R. Brout

F. Englert

P. Higgs

G. S. Guralnik

C. R. Hagen

T. W. B. Kibble

Niveau fondamental en physique
Il existe dans la nature un Champ
Brisure spontanée de symétrie

Notion de niveau fondamental en physique

- Il correspond au niveau de plus basse énergie.

Exemple d'une bille dans une flûte à champagne ou dans la bouteille.

Le point bas
est à la position zéro

Le point bas
n'est pas à la position zéro
Équilibre non symétrique

Mécanisme de "Higgs"

Etat fondamental:
le plus bas potentiel V

- Brisure Spontanée de Symétrie créant un nouveau champ:
un champ scalaire non nul à l'état fondamental.

Haute température:
champ nul dans l'état
fondamental

Particules

dans un champ nul

® elles n'interagissent pas:
elles restent **sans masse**.

Basse température:
champ non nul dans l'état
fondamental

Particules

dans **un champ non nul**

→ elles interagissent:
elles acquièrent une **masse apparente**.

S. L. Glashow

A. Salam

S. Weinberg

G. 't Hooft

M. Veltman

Unification: "théorie électrofaible"

Prix Nobel 1979

"Théorie électrofaible opérationnelle"

Prix Nobel 1999

A partir de 2 ingrédients essentiels:

- La symétrie de jauge (Glashow),
mais celle-ci implique des bosons médiateurs sans masse,
alors que la force faible est à courte portée !
- La parade (Salam, Weinberg): mécanisme créant de la masse
via la "Brisure Spontanée de Symétrie" BSS,
mécanisme postulé par les 6 théoriciens BEHGHK.

La Brisure Spontanée de Symétrie

Un exemple:
Le magnétisme !

Considérons un matériau magnétique: exemple oxyde ferrique

Température ambiante

(20°C)

Aimant:

Dipôles à l'échelle atomique
(Ferromagnétisme)

Chauffage > point de Curie

(858 °C pour Fe_3O_4)

Aimantation perdue:

Désordre des dipôles
(Paramagnétisme)

Refroidissement à température ambiante

Il suffit que 2 dipôles voisins $\longrightarrow$ Aimantation retrouvée
aient même orientation

Typiquement, une Brisure Spontanée de Symétrie
avec un changement de phase.

Temps de Planck

Les particules n'ont pas de masse

(- 270,45 °C)
Aujourd'hui

Les particules sont massives

Les conséquences: depuis cette époque,

- les bosons vecteurs W^+ W^- et Z^0 acquièrent leur masse, mais pas les photons $\gamma \rightarrow$ tout rentre dans l'ordre !
- Ce n'est pas fini: il y a un bonus
toutes les particules "massives" (leptons et quarks)
acquièrent également une masse.
- Et puis, il y a un super-bonus: une nouvelle particule
qui est une "excitation" du champ scalaire:

Le boson de "Higgs"

Exemple: Une piscine,
eau bien calme

Nous y jetons une boule

- Nous pouvons assimiler:
 - l'eau au **champ de Higgs**,
 - les **ondes sonores** qui s'y propagent au **boson de Higgs**.
- Si nous marchons dans l'eau, celle-ci **s'oppose au mouvement**: nous sommes plus "massifs".
- Notons bien que l'eau (le champ) **existe en l'absence** de l'onde (le Boson).

L'observation du boson de Higgs
serait la preuve absolue de la validité du mécanisme.

Mais

Les bosons scalaires de Higgs

abondamment créés lors de la Brisure Spontanée de Symétrie

ont disparu très rapidement

peu après la transition de phase... il y a 13,7 Milliards d'années.

Seul subsiste ...

le champ de Higgs qui baigne tout notre Univers

...

si le mécanisme est vrai !

Alors,
comment procéder ?

Recréer en laboratoire
les conditions de l'époque
primordiale !

LHC: 9300 aimants
dont 1232 dipôles
- Longueur 14 mètres
- Masse 35 tonnes

Consommation:
120 MW
~ Canton
de Genève

Câbles
supraconducteurs
Niobium-Titane
à $-271,3\text{ }^{\circ}\text{C}$

Détection
des
particules

Nature
Trajectoire
Energie

muon

électron

électron

Instable
le boson H
se désintègre

Il y a du
"Bruit de fond"
et des "sosies"

muon

A partir des débris: nous remontons au boson de Higgs

et
petites filles

Chasse au Higgs depuis 2011: valeurs attendues ... s'il existe

Production d'un boson de 125 GeV

5 milliards de collisions $\rightarrow$ 1 boson H

"Bons" canaux étudiés (peu abondants)

$H \rightarrow \gamma\gamma$ 2,2 fois sur mille

$H \rightarrow ZZ^* \rightarrow 4l$ 1,3 fois sur 10 mille

Observation

Efficacités de détection/reconstruction:

≈ 40 et 25%

Il faut donc du temps et
accumuler les données

Joe Incandela (CMS)

Fabiola Gianotti (ATLAS)

Première rencontre Englert-Higgs

CMS Experiment at the LHC, CERN

Data recorded: 2012-May-13 20:08:14.621490 GMT

Run/Event: 194108 / 564224000

S/(S+B) Weighted Events / 1.5 GeV

CMS Experiment at the LHC, CERN
Data recorded: 2012-May-27 23:35:47.271030 GMT
Run/Event: 195099 / 137440354

Candidat Higgs donnant 4 muons

ATLAS
EXPERIMENT
<http://atlas.ch>

Run: 204769
Event: 71902630
Date: 2012-06-10
Time: 13:24:31 CEST

Candidat Higgs donnant 4 électrons

ATLAS
EXPERIMENT
<http://atlas.ch>

Run: 203602
Event: 82614360
Date: 2012-05-18
Time: 20:28:11 CEST

Candidat Higgs donnant 2 électrons et 2 muons

ATLAS
EXPERIMENT

<http://atlas.ch>

Run: 205113
Event: 12611816
Date: 2012-06-18
Time: 11:07:47 CEST

$$H \rightarrow \gamma \gamma$$

$$H \rightarrow ZZ^* \rightarrow 4 \text{ leptons}$$

Annonces simultanées de la découverte
d'un nouveau boson ressemblant au Higgs

Beaucoup d'émotion

CMS Preliminary

#NobelPrize

Nobelprize.org

The Nobel Prize in Physics 2013

Evolution of the signal for the new particle in 2011 and 2012

<https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/CMSPublic/Hig13002TWiki>

Prix Nobel 2013 pour Higgs et Englert !

- Pour la prédiction théorique
- Confirmée par la découverte

Et maintenant ?

L'aventure continue

- La quête du "boson de Higgs":
une épopée scientifique et humaine
hors du commun
- Triomphe de l'intelligence humaine:
Prix Nobel en 2013 !
- Des chiffres uniques dans la démarche scientifique:
 - Le mécanisme dès 1964 ... (peu de particules connues).
 - La durée de la quête: 48 ans.
 - Des collaborations mondiales.
 - Le "dispositif" le plus complexe jamais conçu par l'Homme.
 - Des calendriers sans équivalents:
 - Conception, construction et mise en route: 1989-2008.
 - Fonctionnement et améliorations: 2009-2034.

Voyage vers l'infiniment petit

Eau: H_2O

Hydrogène

Noyaux

proton

Combien encore ?

Quark up

↑
Homme
~1 m

↑
Cellule
~ μm

↑
Molécule
~nm

↑
Atome
~ $\text{\AA}$

↑
Noyau

~10 fm

↑
Nucléon ~ fm

↑
Quarks

<am

Le champ de Higgs est présent partout

Il interagit avec les particules et leur
donne une masse

Il interagit avec les particules et leur
donne une masse

On peut exciter ce champ ...

et faire apparaître le « boson de Higgs »