Signaux de DM en rayons γ en provenance de galaxies naines

Contraintes sur $\langle\sigma v\rangle$ avec HESS

Photo : Galaxie Naine Fornax - Crdit: ESO/Digitized Sky Survey 2

Où chercher dans la Galaxie ?

Densité de DM élevée → Plus de chance d'annihilation de DM

Image: <https://infograph.venngage.com/p/215976/milky-way-galaxy-jessica-waldbusser>

→ Centre Galactique (GC) = beaucoup d'autres sources de rayons γ

→ Galaxies Naines Sphéroïdes (DSphs) :

- Forte concentration de DM.
- Faible masse lumineuse.
- Absence d'objets astrophysiques actifs.

45 galaxies naines candidates

Photos: Leo I, Sculptor, Leo T - Credits: SDSS, ESO, SDSS-II

Dsphs observées par HESS (non publiées):

Leo II (1.7h) - Bootes II (1.8h) - Grus II (6.3h) - Indus II (0.9h)

Flux intégré

$$\Phi_{\gamma}(E_{\gamma}) = \int_{E_{\min}}^{E_{\max}} \frac{1}{2} \frac{\langle \sigma v \rangle}{4\pi m_{\chi}^2} \sum_f B_f \frac{dN_{\gamma}^f}{dE_{\gamma}} \int_{\Delta\Omega(\alpha, \phi)} d\Omega' \int_{los} ds \rho_{DM}^2(r(s, \alpha_{\text{int}}))$$

Flux de γ

Facteur Φ_{PP}

Facteur $\mathcal{J}$

HESS

Physique des Particules

Astrophysique

Avec :

- $\langle \sigma v \rangle$: Section efficace d'annihilation moyennée sur la distribution des vitesses.

Valeur de référence: $\langle \sigma v \rangle \sim 3 \times 10^{-26} \text{cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$

- $\frac{dN_{\gamma}^f}{dE_{\gamma}}$: Nombre de γ par annihilation par intervalle d'énergie.

- B_f : Rapport de branchement.

- ρ_{DM} : Densité de matière noire.

Facteur $\mathcal{I}$ pour les galaxies naines

Hypothèses :

- Symétrie sphérique
- Profils de densité de DM

Domaine d'intégration :

- $s \in [s_{\min}, s_{\max}]$
- $\alpha_{\text{int}} \in [0, \alpha_{\text{int}}^{\text{crit}}]$
- $\Phi \in [0, 2\pi]$

Facteur $\mathcal{J}$ pour Leo II

Profil NFW :

$$\rho_{NFW}(r) = \rho_s \frac{r_s}{r} \left(1 + \frac{r}{r_s}\right)^{-2}$$

Profil Einasto :

$$\rho_{Ein}(r) = \rho_s \exp \left\{ -\frac{2}{0.15} \left[\left(\frac{r}{r_s}\right)^{0.15} - 1 \right] \right\}$$

Profil Burkert:

$$\rho_{iso}(r) = \rho_s \frac{r_s^3}{(r + r_s)(r^2 + r_s^2)}$$

- $\mathcal{J}$ augmente jusqu'à un certain angle α_{int}^{crit} .
- **Au-delà** : plus de contribution → Plateau.

$$\Rightarrow \boxed{\mathcal{J}_{DSph}^{max} \sim 10^{17} (\text{GeV}^2 \cdot \text{cm}^{-5} \cdot \text{sr})}$$

Leo II - Extension du halo de matière noire

Angle critique:

- NFW: $\alpha_{\text{int}}^{\text{crit}} = 0.28^\circ$
- Einasto: $\alpha_{\text{int}}^{\text{crit}} = 0.32^\circ$
- Burkert: $\alpha_{\text{int}}^{\text{crit}} = 0.12^\circ$

Rayon :

- NFW: $R_{\text{DSph}} = 1.14 \text{ kpc}$
- Einasto: $R_{\text{DSph}} = 1.30 \text{ kpc}$
- Burkert: $R_{\text{DSph}} = 0.48 \text{ kpc}$

Dans l'analyse HESS: Source étendue ou ponctuelle ?

Signal sur bruit

Rapport Signal sur bruit en fonction de l'angle α

$$\frac{S}{\sqrt{N}} \propto \frac{J(\alpha)}{\alpha}$$

$$r = d \tan \alpha \propto \alpha$$

NFW

$$\text{Max} \left(\frac{S}{\sqrt{N}} \right) \rightarrow \alpha \approx 0.001^\circ$$

Burkert

$$\text{Max} \left(\frac{S}{\sqrt{N}} \right) \rightarrow \alpha \approx 0.015^\circ$$

⇒ Source ponctuelle ($\alpha = 0.1^\circ$)

Paramètres utilisés

- Point like source
- Model++ Stereo HESS1 Std
- Ring Background

Data

- 1.7 live hours (0.7 acc. corr.)
- $N_{ON} = 10$
- $N_{OFF} = 643$
- $\alpha = 48.32$
- $S = -3.3 \gamma$

⇒ Pas d'excès de γ

Flux intégré et énergies

- $E_{\min} = 0.53 \text{ TeV}$
- $E_{\max} = 2.36 \text{ TeV}$
- $\Phi_{\gamma}^{(0.53 \leq E_{\gamma} \leq 2.36)} \leq 1.51 \times 10^{-8} \text{ } \gamma \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \text{ (95\%C.L.)}$

Pour chaque m_{χ} $\rightarrow$ Section efficace d'annihilation $\langle \sigma v \rangle$

$$\Phi_{\gamma}(E_{\gamma}) = \frac{1}{2} \frac{\langle \sigma v \rangle}{4\pi m_{\chi}^2} \int_{E_{\min}}^{E_{\max}} \sum_f B_f \frac{dN_{\gamma}^f}{dE_{\gamma}} \mathcal{J}$$

- Avec:
- $\mathcal{J}_{\text{NFW}}(\alpha = 0.1^{\circ}) = 3.1 \cdot 10^{+17} \text{ GeV}^2 \cdot \text{cm}^{-5}$
 - $\mathcal{J}_{\text{Burkert}}(\alpha = 0.1^{\circ}) = 3.0 \cdot 10^{+17} \text{ GeV}^2 \cdot \text{cm}^{-5}$

Contraintes sur $\langle\sigma v\rangle$ avec Leo II

Contraintes sur la section efficace d'annihilation $\langle\sigma v\rangle$
 $\langle\sigma v\rangle \leq 10^{-20} - 10^{-21} \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ (95% C.L.)

Photo: Galaxie Naine Leo II
Credit: Digitized Sky Survey/Walker

- Contraintes sur Leo II
- Reproduire les contraintes sur Sculptor
- Contraintes sur Bootes II, Grus II, Indus II
- Contraintes sur les 4 galaxies combinées
- Travail avec Aion du 29 mai au 2 juin

Merci pour votre attention !

Quarks et Leptons:

$$\frac{dN_\gamma}{dx} = a_1 x^{-1.5} \exp\left(-b_1 x^{n_1} - b_2 x^{n_2} - \frac{c_1}{x^{d_1}} + \frac{c_2}{x^{d_2}}\right) + q \ln(p(1-x)) \frac{x^2 - 2x + 2}{x}$$

Bosons W et Z:

$$\frac{dN_\gamma}{dx} = a_1 x^{-1.5} \exp\left(-b_1 x^{n_1} - \frac{c_1}{x^{d_1}}\right) \left(\frac{\ln(p(j-x))}{\ln p}\right)^q$$

Profils de densité - Leo II