

A sunset landscape with a large satellite dish antenna in the foreground and a small white building in the distance. The sky is filled with scattered clouds, and the sun is low on the horizon, creating a warm orange glow. The foreground is dark, suggesting a field or plain.

Marie-Hélène Grondin
Marianne Lemoine


Laboratoire de Physique des 2 Infinis
Université de Bordeaux


Qui sommes nous ?

M-H Grondin: maître de conférences à l'Université de Bordeaux

M Lemoine: Directrice de recherches au CNRS

Affectées au Laboratoire de Physique des 2 Infinis Bordeaux





* Cycle Préparatoire aux écoles d'ingénieurs chimistes et de génie chimique maintenant dénommé Chem.i.St (Chemistry International Studies)

**Classe préparatoire aux grandes écoles

Les chercheurs

Les chercheurs se répartissent dans **des disciplines très variées** : sciences et techniques, lettres et sciences humaines, droit, économie, gestion, médecine...

Ils travaillent dans **de nombreux organismes**:

des EPST (établissements publics à caractère scientifique et technologique) : CNRS, INRAE, INSERM, IRD, INRIA, INED...

des Epic (établissements publics à caractère industriel et commercial) : CEA, CNES, Ifremer, Institut Pasteur, ADEME, ONF...

des EPSCP (établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel) : instituts nationaux polytechniques, ENS...

de grandes entreprises privées industrielles (Total...) ou pharmaceutiques (Sanofi...).





C'est quoi le CNRS ?

Plus grand organisme public de recherche en Europe

Plus de 1100 laboratoires en France et à l'étranger, en grande majorité rattachés à des universités

Plus de 33 000 agents dont 15 000 chercheurs et 16 000 ingénieurs


10 instituts: biologie, physique, chimie, ingénierie, sciences humaines et sociales, mathématiques, écologie, sciences de l'information et sciences de l'univers

Un budget annuel de 3,8 milliards d'euros



Qu'est-ce que la recherche

- Se poser des questions
- Résoudre le problème posé
 - Faire des essais dans un cas simple
 - En tirer une méthode pour un cas plus général
 - Savoir rebrousser chemin si on est dans une impasse !
- Trouver des relations avec d'autres problèmes
 - Ce qui revient à se poser d'autres questions!
- Rédiger, publier et communiquer ses résultats.



Les maîtres de conférences

Le maître de conférences est un enseignant-chercheur. Double mission d'assurer le développement de la recherche fondamentale et appliquée et de transmettre aux étudiants les connaissances qui en découlent

Que ce soit à l'université, en IUT ou encore dans les grandes écoles, les postes de maître de conférences se répartissent dans des disciplines variées

Le maître de conférences assure 128h de cours magistraux par an, ou 192h de TD (travaux dirigés), ou 288h de TP (travaux pratiques).

En parallèle, le maître de conférences se consacre à des travaux de recherche et de publication



Les techniciens et ingénieurs au CNRS

- Technicien (Bac)
- Assistant Ingénieur (Bac+2)
- Ingénieur d'Etudes (Bac+3-Bac+5, écoles d'ingénieur, Master)
- Ingénieur de Recherche (grandes écoles ou thèse)



De la recherche fondamentale à l'innovation technologique

> 15 prix Nobel ont contribué à des découvertes nécessaires pour son fonctionnement



DÉCOUVERTES

Relativité, mécanique quantique, télégraphie sans fil, transistor, stockage électrochimique, technologies de l'information, magnétorésistance géante, communication fibres optiques, capteurs CDD, cristaux liquides, diodes bleues...


INVENTIONS

Electronique, informatique, réseaux de communication, disques durs, GPS, Batteries Li-ions ...

INNOVATIONS

Téléphone, ordinateur, Internet :
ont convergé pour donner le smartphone ...

La constellation d'Orion



Voir le passé


Vitesse lumière = 300 000 km/s

1 année lumière = 9461 milliards de km = 63 241 UA



La grande Nébuleuse d'Orion: M42

Charles Messier (1730 - 1817)



Credits: NASA, ESA, M. Robberto (Space Telescope Science Institute/ESA) and the Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team

Des étoiles toutes très différentes

Naine Rouge
0,08 - 0,4 masse solaire

3 000°C




Etoile Solaire
~ 1 masse solaire
6 000°C


10 000°C

Géante Bleue
jusqu'à 100 masses solaires ?



30 000°C




**MOINS
CHAUD**



**PLUS
CHAUD**



Les étoiles de la naissance à la mort



Lorsqu'une étoile géante disparaît...



Supernova



Réunion,

Supernova à effondrement de coeur



Supernova





Energie libérée: 3×10^{46} J

Neutrinos: 99%

Energie cinétique: 1%

Rayonnement électromagnétique: 0.1%



Estimations énergétiques


- ❑ Energie d'un micro-onde de 1kW utilisé pendant 1 minute: 60 kJ
- ❑ Energie dégagée par le bombardement d'Hiroshima: 6×10^{13} J
- ❑ Energie dégagée par la plus puissante bombe nucléaire testée, la bombe Tsar Bomba: 2×10^{17} J
- ❑ Energie dégagée par la collision d'une météorite de 10km dans le Golfe du Mexique: 5×10^{23} J
- ❑ Energie cinétique dégagée par une supernova: 10^{44} J
- ❑ Energie dégagée par le Soleil en 10 milliards d'années: $1,2 \times 10^{44}$ J




Un reste de supernova historique

SN 1572 (également appelée Supernova de Tycho)

=> Révolution en Astronomie; développement des catalogues




Distantiam verò huius stellæ à fixis aliquibus in hac Cassiopeiæ constellatione, exquisito instrumento, & omnium minorum capacj, aliquoties obseruavi. Inueni autem eam distare ab ea, quæ est in pectore, Schedir appellata B, 7. partibus & 55. minutis: à superiori verò




Credit: NASA/CXC/Rutgers/J. Warren & J. Hughes et al.

Le rayonnement cosmique

- ❑ Découvert en 1912 (Victor HESS)
- ❑ 10 ordres de grandeur en énergie, 30 en flux
- ❑ Composition: 99% de noyaux & 1% d'électrons
- ❑ Origine toujours inconnue



Vol en ballon
Victor Hess, 1912



Les vestiges de supernovae : accélérateurs cosmiques

- **Rayons cosmiques chargés**: diffusion sur les champs magnétiques galactiques
=> **perte de l'information directionnelle**
- **Rayons gamma**: produits sur les sites d'accélération des RCs
=> **information sur le site d'accélération**

Un candidat excellent :
Les vestiges de supernovae

Problème non résolu depuis 1912 !




**Rayons cosmiques
chargés**

La lumière invisible !




La lumière visible représente une octave sur près de 70 !
Le rayonnement gamma couvre 20 octaves à lui seul




Les instruments en Astronomie gamma

γ mous: $E < 10$ MeV

INTEGRAL





γ de haute énergie:
 10 MeV $< E < 100$ GeV
EGRET, AGILE, Fermi



γ de très haute énergie
 $E > 100$ GeV
HESS, VERITAS...








Le Large Area Telescope (LAT) à bord du Fermi Gamma-Ray Space Telescope

Large Area Telescope (LAT):

Grand domaine d'énergie

Grand champ de vue

Bonne surface efficace




Gamma-ray Burst Monitor (GBM)

voit l'ensemble du ciel inocculté pour observer les phénomènes transitoires

Lancement 11 Juin 2008

=> Plus de 14 ans de découvertes extraordinaires !



Les photons gamma interagissent avec la matière par production de paires électron-positron. Le LAT est un détecteur de particules.

Energies : de 100 MeV (1.6×10^{-13} J) à 2 TeV (3.2×10^{-7} J) soit ~4 décades !


Cascades atmosphériques

Interaction du photon primaire avec un noyau de l'atmosphère


Succession de créations de paire et de rayonnement de freinage

L'énergie est ainsi peu à peu redistribuée en un grand nombre de particules et absorbée dans l'atmosphère

Les cascades issues de protons (et de noyaux) comportent en sus des fragments nucléaires et des particules pénétrantes (muons, ...)



Principe de l'imagerie Tcherenkov






Astrophysique avec H.E.S.S.

Sources extragalactiques

- Noyaux actifs de galaxie (NAGs)
- Galaxies à flambée d'étoiles
- Amas de galaxies
- Sursauts gamma ??


Sources galactiques

- Vestiges de supernovae (SNRs)
- Plérions
- Systèmes binaires
- Sources non identifiées



Principe de la stereoscopie

direction



Les détecteurs Tcherenkov



High Energy Stereoscopic System



Consortium international, mené par Allemagne + France

Site: 23°16' S, 16°30' E, 1800 m asl, 100 km de Windhoek (Namibie)

très bonne qualité optique du ciel

hémisphère peu observé, grande partie du plan galactique observable

MPI Kernphysik, Heidelberg
Humboldt Univ. Berlin
Ruhr-Univ. Bochum
Univ. Hamburg
Landessternwarte Heidelberg
Ecole Polytechnique, Palaiseau
APC Paris
LPNHE Univ. Paris VI-VII
CEA Saclay
CESR Toulouse
LPTA Montpellier
LAOG Grenoble
LAPP Anecy
CENBG Bordeaux
Observatoire de Paris
Durham Univ.
Dublin Inst. for Adv. Studies
Charles Univ., Prag
Yerewan Physics Inst.
North-West Univ., Potchefstroom
Univ. of Namibia, Windhoek
DESY, Zeuthen
Linne University, Sweden
Leicester University, UK
Nicolaus Copernicus Astronomical Center, Warsaw
University of Warsaw (UW)
Jagiellonian University, in Cracow
Institute of Nuclear Physics, Cracow
Nicolaus Copernicus University, Torun



Réunion, 2022

H.E.S.S.-II



H.E.S.S. Phase 1:

Installation en 2002-2003

4 télescopes: \varnothing 12 m, 107 m²

Reconstruction stéréoscopique

Observations : ~1000h/an

H.E.S.S. Phase 2:



Installation en 2012

5^{ème} télescope, \varnothing 28 m, 600 m²

Pointé en < 1 min sur 50 % du ciel


Les petits télescopes H.E.S.S.

- ◆ Réseau de 4 petits télescopes
Séparation des télescopes: 120 m
- ◆ Structure des télescopes
Surface totale des miroirs: $4 \times 10^7 \text{ m}^2$
Diamètre: 12 m, Longueur focale: 15 m
- ◆ Miroirs
380 × 60cm petits miroirs circulaires



Les « petites » caméras

- ◆ 960 photomultiplicateurs
- ◆ Très grand champ de vue de 5°
- ◆ Fenêtre d'intégration de 16ns,
- ◆ Electronique *intégrée* dans la caméra
- ◆ Loge dans un cube de 2 m
- ◆ Poids ~ 900 kg



Le grand télescope

- ◆ Camera: 3800 images/secondes

Loge dans un carré de 2,5m

Consommation de 8kW

Poids total de 2.8 Tonnes ! (longueur focale: 36m)


- ◆ Structure du télescope

Dimension de la surface réfléchissante: 24m × 33m

- ◆ Miroirs

875 × 90cm petits miroirs hexagonaux

Poids total du télescope: 580 Tonnes !



Le Futur

- Plus d'événements


 - Plus de photons grâce à des surfaces de collection plus grandes

- Meilleurs événements

 - Meilleure reconstruction

- Nouveaux événements

 - Domaine d'énergie étendu



CTA: Cherenkov Telescope Array

> 1400 membres

208 instituts provenant de 32 pays

2 sites sélectionnés:

Nord (La Palma, Canaries)

Sud (Paranal, Chili)


3 tailles de télescopes

~100 télescopes prévus en tout

Nord



Sud



Astrophysique en rayons gamma

Sources extragalactiques

- Noyaux actifs de galaxie (NAGs)
- Galaxies à flambée d'étoiles
- Sursauts gamma

Sources galactiques

- Vestiges de supernovae (SNRs)
- Nébuleuses de pulsars
- Systèmes binaires
- Sources non identifiées
- Novae

