ATLAS

Recherche du Boson de Higgs chargé et étiquetage des jets b

Rémy ZAIDAN

Plan

- Le Cadre experimental:
 - ATLAS et le LHC.
- Le cadre théorique:
 - La Supersymétrie et le boson de Higgs.
- L'analyse:
 - La préselection.
 - L'étiquetage des jets b.
 - La reconstruction à l'aide d'une fonction de vraisemblance.
 - Resultats.
- Résumé et conclusion.

ATLAS et le LHC

Le LHC:

- Collisionneur proton-proton
- 14 TeV au centre de masse
- 27 km de circonférence
- 40 MHz de collisions

ATLAS:

- 22 m x 42 m - 7000 tonnes
- $10^{34} \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$
- Physique:
 - Higgs
 - Quark top
 - Nouvelle Physique...

La Supersymétrie et le Higgs

	Spin 0	Spin 1/2	Spin 1	Représentation
Squarks, quarks ($\times 3$)	$(\tilde{u}_L \tilde{d}_L)$	$(u_L d_L)$		$(3, 2, 1/6)$
	$\tilde{u}_R$	u_R		$(3, 1, 2/3)$
	$\tilde{d}_R$	d_R		$(3, 1, -1/3)$
Sleptons, leptons ($\times 3$)	$(\tilde{\nu} \tilde{e}_L)$	(νe_L)		$(1, 2, -1/2)$
	$\tilde{e}_R$	e_R		$(1, 1, -1)$
gluino, gluon		$\tilde{g}$	g	$(8, 1, 0)$
Winos, W bosons		$\tilde{W}^\pm \tilde{W}^0$	$W^\pm W^0$	$(1, 3, 0)$
Bino, B boson		$\tilde{B}^0$	B^0	$(1, 1, 0)$
Higgs, higgsinos	$(H_u^+ H_u^0)$	$(\tilde{H}_u^+ \tilde{H}_u^0)$		$(1, 2, 1/2)$
	$(H_d^0 H_d^-)$	$(\tilde{H}_d^0 \tilde{H}_d^-)$		$(1, 2, -1/2)$

$h^0, A^0, H^0, H^+, H^- + 3$ Goldstone

$$\left. \begin{aligned} v_u &= \langle H_u^0 \rangle \\ v_d &= \langle H_d^0 \rangle \end{aligned} \right\} \Rightarrow \tan \beta = \frac{v_u}{v_d}$$

Le canal de recherche:

$$gg / qq \rightarrow tbH^\pm \rightarrow t\bar{t}b\bar{b}$$

- $M_H > M_t + M_b$
- Grand rapport de branchement de $H^\pm \rightarrow tb$
- Bruit de fond combinatoire important

Les canaux alternatifs:

- $H^\pm \rightarrow \tau\nu$
 - Petit rapport de branchement
 - Moins de bruits de fond
- $t \rightarrow H^\pm \rightarrow \tau\nu$
 - $M_H < M_t + M_b$
 - Grand rapport de branchement

Sur ATLAS, des études précédentes ont été faites avec des simulation rapides. Les résultats doivent être mis à jour avec la simulation complète

- 1 lepton isolé :
 - électron :
 - $p_T > 25 \text{ GeV}$; $|\eta| < 2.5$
 - isolation : $< 10 \text{ GeV}$ dans un cône de $\Delta R = 0.3$
 - Identification basée sur les paramètres de la gerbe électromagnétique.
 - muon :
 - $p_T > 20 \text{ GeV}$; $|\eta| < 2.5$
 - isolation : $< 10 \text{ GeV}$ dans un cône de $\Delta R = 0.3$

- au moins 5 jets avec
 - $p_T > 25 \text{ GeV}$; $|\eta| < 5$:
 - parmi lesquels au moins 3 b jets :
 - $p_T > 25 \text{ GeV}$; $|\eta| < 2.5$; $w > 4$
 - veto sur les jets aussi reconstruits comme électrons

Etiquetage spatial: Les mésons B ont une durée de vie non nulle.

- ⇒ $E(B) \sim 50 \text{ GeV}$, $L \sim 5 \text{ mm}$
- ⇒ Existence d'un vertex secondaire dans le jets
- ⇒ algorithme d'étiquetage *SVI*:
- ⇒ Grand paramètre d'impact des traces.
- ⇒ algorithme d'étiquetage *IP3D*

Etiquetage par leptons mous:

- ⇒ Electrons ou muons provenant de désintégration de mésons B

Eléments indispensables:

- ⇒ Une bonne résolution du détecteur à pixels.
- ⇒ Un bon algorithme de reconstruction des traces.
- ⇒ Une bonne identification des leptons.

Vertex secondaire:

Paramètre d'impact:

IP3D:

$$w_j = \sum_{trk \in jet} \ln \frac{P_b^{trk}(S_{d_0})}{P_u^{trk}(S_{d_0})}$$

SV1:

$$P_j = \prod_{i=1}^n \frac{f_j(x_i)}{\sum_{k=u,b} f_k(x_i)} ; \quad \mathcal{L} = \frac{P_b}{\sum_{j=u,b} P_j}$$

Weight = IP3D + SV1

Etude de l'influence de la matière dans le détecteur:

Simulation avec plus de matière:
 ⇒ Une pire résolution sur le paramètre d'impact.
 ⇒ Une perte d'un facteur ~ 1.4 en réjection.

purified light jet rejection (IP3D+SV1)

Efficacité :

$$\epsilon_b = \frac{\# \text{ de jets b étiquetés}}{\# \text{ total de jets b}}$$

Réjection :

$$R_j = \frac{\# \text{ total de jets non b}}{\# \text{ de jets non b étiquetés}}$$

Reconstruction: W leptonique

La composante longitudinale de l'impulsion du neutrino est calculée en imposant au W sa masse nominale:

$$m_W^2 = (E_l + E_\nu)^2 - (\vec{p}_l + \vec{p}_\nu)^2$$

Avec:

- $p_\nu^x = p_{miss}^x$
- $p_\nu^y = p_{miss}^y$
- $E_\nu = \sqrt{p_\nu^{x2} + p_\nu^{y2} + p_\nu^{z2}}$

⇒ Equation du second degré pour déterminer p_ν^z

~ 25% des cas: $\Delta < 0$!!

On néglige alors la partie imaginaire de la solution:

$$\Delta = 0$$

Reconstruction: “Likelihood” combinatoire

m observables,
 n classes:

$$\mathcal{L}^j = \frac{\prod_{l=1}^m p_l^j(x_l)}{\sum_{k=1}^n \prod_{l=1}^m p_l^k(x_l)}$$

Avec:

$$p_i^j(x_i) = \frac{f_i^j(x_i)}{\sum_{k=1}^n f_i^k(x_i)}$$

Reconstruction

!!Grand bruit de fond combinatoire!!

$$N_H = 2 \times N_\nu \times 4! \times \binom{m}{2} \approx 100 - 1000$$

Puretés de reconstruction:

- W Hadronique : 38%
- top Leptonique : 52%
- top Hadronique : 28%
- Higgs Chargé : 24%

Bruits de fond réductibles et irréductibles:

$$\begin{aligned}
 gg / qq &\xrightarrow{EIW} t\bar{t}b\bar{b} \quad (0.90 \text{ pb}) \\
 gg / qq &\xrightarrow{QCD} t\bar{t}b\bar{b} \quad (8.2 \text{ pb}) \\
 gg / qq &\rightarrow t\bar{t} + \text{jets} \quad (833 \text{ pb})
 \end{aligned}$$

	1 lepton	5 jets	reconstruction	Domaine de masse de $\pm 100 \text{ GeV}$
Signal	$(58.1 \pm 0.4) \%$	$(10.6 \pm 0.3) \%$	$(7.3 \pm 0.2) \%$	$(6.6 \pm 0.2) \%$
ttbb (EIW)	$(60.2 \pm 0.6) \%$	$(11.7 \pm 0.4) \%$	$(8.5 \pm 0.3) \%$	$(6.5 \pm 0.3) \%$
ttbb (QCD)	$(60.4 \pm 0.2) \%$	$(11.4 \pm 0.15) \%$	$(7.5 \pm 0.1) \%$	$(5.0 \pm 0.1) \%$
tt	$(35.7 \pm 0.1) \%$	$(0.87 \pm 0.02) \%$	$(0.43 \pm 0.01) \%$	$(0.32 \pm 0.01) \%$

Résultats

Discovery Potential ($m_{H^\pm} = 250\text{GeV}$)

La Significane étant donnée par:

$$S = \frac{N_{Signal}}{\sqrt{N_{Bruit}}}$$

Avec :

$$N = \varepsilon \times \sigma \times \mathcal{L}$$

ε = Acceptance de l'analyse

σ = section efficace $\times$ rapports de branchement

$\mathcal{L}$ = luminosité intégrée sur 3 ans = 30 fb^{-1}

Potentiel de découvertes:

5σ : $\tan \beta < 3.45$ ou $\tan \beta > 26$

3σ : $\tan \beta < 4.7$ ou $\tan \beta > 19.5$

Conclusion

Deux axes de travail:

- Recherche du boson de Higgs chargé:
 - ✓ Analyse bien avancée.
 - Plusieurs aspects en cours d'amélioration.
 - Etude des systématiques.
 - Extraction du signal.

- Etiquetage des jets b:
 - ✓ Travail vient d'être commencé.
 - Comprendre les différents paramètres affectant les performances et essayer de les améliorer.
 - Mesure sur les données des différents ingrédients.