CTA : Le (futur) réseau des télescopes Tcherenkov

Christopher Lindsay Naumann

Biennale du LPNHE , Beg Meil

20 / 09 / 2011

détection des rayons gamma des énergies TeV par gerbes atmosphériques

réseau Tcherenkov

- télescopes ultra-sensibles
- électronique rapide
- site: déserts, montagnes

sources galactiques et extragalactiques

physique exotique (matière noire, gravitation quantique...)

instruments actuels

expériences actuels: premières détections des sources fortes
beaucoup des effets intéressants caches *juste derrière l'horizon ?*

→ **instruments de la prochaine génération !**

grand réseau des ~100 télescopes dans l'hémisphère Nord et Sud:

3 tailles, espacement ~50-200m

- grand (~24m): **basses énergies**, seuil ~10 GeV
- moyen (~12m): «cœur» du réseau, **haute sensibilité** à 100GeV-10TeV
- petit (~7m): hautes énergies, ~10 km² aux énergies **multi-TeV**

QUOI ?

Buts du dessin:

- sensibilité $\times 10$ aux énergies TeV
- seuil réduit (q.q. 10 GeV)
- gamme en energie jusqu'aux PeV ?
- meilleure résolution angulaire

QUI ?

Consortium international (HESS, MAGIC, VERITAS, ...)

- roadmaps Européens
- étude de dessin $\rightarrow$ 2010
- PP + prototypage 2011-2013
- construction 2014+ ?

OÙ ?

1 réseau Sud + 1 Nord

- atmosphère, hauteur
- infrastructure
- ....

$\rightarrow$ présélection fin 2011?

QUAND ?

technologies de base existent déjà

→ optimiser qualité - prix pour grand réseau

→ système et infrastructure (prise des données) stable, fiable, à maintenance réduite

« work packages » *Télescopes, Monte-Carlo, Électronique, Site...*

nouvelles méthodes
de lecture

analyse et reconstruction
des images

informatique: hard et soft

détecteurs de lumière

mécanique des télescopes

miroirs

architecture front-end

électronique, système de
déclenchement, lecture

LPNHE

LPNHE

LPNHE

- simulation à grande échelle des configurations (taille, distances, systèmes de déclenchement...)
- utilisation des technologies du grille (EEGE, GÉANT, VO...)
- comparaison des candidates à coût similaire (~80 M€)

Ex: performance pour différents configurations

optimisation basse $\leftrightarrow$ haute E

$\rightarrow$ choix dépendent aux buts scientifiques!

Equipe physique : 5 (partagé avec HESS)

Julien Bolmont, Agnieszka Jacholkowska, Christopher Naumann, Jean-Paul Tavernet, Pascal Vincent.....

Equipe technique actuelle : 10 (t. p.)

Pascal Corona, Jean François Huppert, Patrick Nayman, Jean-Marc Parraud, Philippe Gauron (Nicolas Roche), Colette Goffin, Eric Pierre, Patrick Ghislain, Daniel Vincent, François Toussenel

développement technique → voir présentation François
études sur l'invariance de Lorentz (Agnieszka, Julien)
simulations pour déclenchement et lecture (Christopher)

effet étudié dans HESS (voir Julien)

- **gamme en énergie** → « bras de levier »
- **nombre des photons** → *erreur statistique*

CTA: *taux des évènements* × 10
→ *beaucoup plus sensible ?*

simulation: *séparation des pulses consécutifs*

inséparable

séparable

quelle séparation entre « basse » et « haute » énergie ?

différents configurations du CTA → gamme en énergie optimale pour maximiser la sensibilité source à distance $z=0.03$

spectre AGN

présenté par Julien à l'ICRC 2011

- mesure du délai améliorée
- meilleures statistiques
- bras de levier > 500 GeV

→ limite prévue

$$E_{LIV}^1 \gg E_{\text{planck}}$$

$$E_{LIV}^4 > 10^{12} \text{ GeV}$$

meilleure limite du monde !

projet COLIBRI:

optimiser déclenchement
et lecture d'une camera
modulaire

gamma 15 TeV, duration 55ns

- simulation des images des gerbes
- lecture partielle de la camera

→ réduction des données et du temps mort (x10!)

→ possibilité de **suivre le développement** de l'image

→ option proposée pour CTA

→ prototype en développement

Conclusions

- CTA: futur réseau des télescopes Tcherenkov
- ~100 télescopes sur deux sites
- sensibilité ~facteur 10 sur expériences actuelles
- sources (extra-) galactiques, physique exotique
- construction 2014+
- LPNHE participe au développement du projet:
  - chip, carte front-end, lecture partielle et flexible
  - études de sensibilité

Clubs enfants

premières résultats: Biennale 2015 ???

FIN

~milli-Crab réaliste dans la région focus
gain ~ $\times 10$ sur expériences actuelles,
avec gamme en énergie plus grande
région commune avec satellites (Fermi...)

CTA va « compléter »
l'astronomie des photons
→ production en masse
des sources (comme déjà
en radio, X, gamma mou...)

pour chaque taille, plusieurs possibilités étudiées
→ simulations, prototypes

LST : poids, taille (HESS-II !)

→ fibre de carbone

→ correction active des miroirs...

MST : plusieurs possibilités

→ cout et flexibilité

SST:

→ Davies-Cotton ? Schwarzschild-Couder ?

→ grandes ou petites cameras ?

operation as **open observatory** (unlike HESS, MAGIC,...)

external observation proposals

→ peer-reviewed selection process

→ operation by experts, data “on demand”

infrastructure:

- EGEE, GÉANT + VO
- data storage and access via GRID
- development of software for “black-box” analysis

also prepare public “legacy data”
(galactic plane or full-sky scans)