La formation et l'évolution du système solaire, ce que nous disent les poussières...

Jean Duprat

CSNSM-CNRS-Université Paris XI

8^{èmes} Journées Informatique de l'IN2P3-IRFU
Lalonde les Maures 24 octobre 2012

Du Big-Bang à nous ...

L'architecture actuelle du système solaire

la ligne des glaces

- M Soleil ($M_{\odot}$) : $1.99 \cdot 10^{30}$ kg
- M Terre ($M_{\oplus}$) : $5.97 \cdot 10^{24}$ kg
- M Jupiter (M_{J}) : $1.90 \cdot 10^{27}$ kg ($317 M_{\oplus}$, $0.1\% M_{\odot}$)

Pourquoi une telle dichotomie entre le système solaire interne et externe ?

En deçà de *la ligne des glaces*, un monde des roches...

- Les planètes « terrestres », le monde tellurique
- Faibles masses (total $2 M_{\oplus}$)
- Hautes densités ($4 - 5.5 \text{ g/cm}^3$)
- Des atmosphères secondaires

Au delà de *la ligne des glaces* : un monde de gaz et de glaces...

Jupiter, ♃

Saturne

les géantes gazeuses

- Masses élevées (318 and 95 $M_{\oplus}$)
- Densités faibles (1.3 and 0.7)
- Atmosphère primaire (H, He)

les géantes de glaces

Uranus

Neptune

- Des objets glacés
- Masses élevées (14.5 et $17.2 M_{\oplus}$)
- Densité faible (1.6)

La formation des planètes géantes

La formation d'un cœur de 10-15 x la masse terrestre a déclenché **l'effondrement local du disque** :

- de nombreux satellites
- un système d'anneaux

Il y a 4,5 milliards d'années,
le soleil et les planètes se formaient...

Quels témoins pouvons nous retrouver ?

Les astéroïdes

- Le premier découvert Ceres 1801 (948 km)
- Puis suivis de
 - Pallas 1802 (532 km)
 - Juno 1805
 - Vesta 1807 (529 km)
- Masse totale ~ 4 % de la Lune (0.05% Mt)
- Des dizaines de milliers d'objets
- 1 à 2 millions d'astéroïdes > 1 km

Giuseppe Piazzi
(1746 - 1826)

Météorites & Antarctique

+ 30,000 meteorites
USA, Japon, Italie

Antarctic Meteorite
Research

PI : R. Harvey, Case Univ. US

D' où viennent les météorites ?

2004 08 14 23:40:48 GST
Real time

This addon for the Celestia
3D Space Simulator can be found at
www.celestiamotherlode.net

Speed: 0.000 m/s

Follow Gaspra
FOV: 25° 36' 6.5" (1.00x)

Entre Mars et Jupiter, les astéroïdes...
nos voisins immédiats

Aux confins du système solaire...

les comètes

Terre soleil : 1 UA = 10^9 km

Pluton : 50 UA

La ceinture de Kuiper : 70 UA

Le Nuage Oort : > 50 000 UA

Qu'est ce que le matériau cométaire ?

STARDUST mission
(janvier 2006)

Itokawa
Mission Hayabusa
(Juin 2010)

La mission **ROSETTA**
(novembre 2014)

Janvier 2006, le retour de la mission STARDUST (NASA)

**Wild 2
Orbital Evolution**

January 2006

**Janvier 2004
Comète 81P/Wild 2**

Décembre 2006, les premiers résultats

Les principaux résultats de la mission STARDUST

Olivine + glass

Nakamura et al. Science 2008

JSM-7000F SEM COMPO 15.0kV X3,300 WD 15.4mm 1 μ m

"Remarkably enough, we have found fire and ice"

- Taille 1-10 μ m
- Une composition moyenne identique à celles des chondrites (CI).
- Présence de phase réfractaires (CAI, chondres).

«...Their presence in a comet proves that the formation of the solar system included mixing on the grandest scales...» Brownlee et al. Science 2006

De la poussière extraterrestre,
les premières collectes terrestres...

1873-1876 : l'expédition HMS *Challenger*

-> **Sphérules cosmiques**
(micrométéorites fondues lors de
l'entrée atmosphérique)

Murray 1876

Des sphérules cosmiques au centre des océans

The Voyage of H.M.S. „Challenger“

Deep Sea deposits Plate XXIII.

Murray & Renard 1891

Et sur terre... est-il possible de trouver des poussières interplanétaires ?

Le matériel et les chercheurs sont transportés de Tasmanie vers la Terre Adélie

La station côtière de Dumont D'Urville

De Cap Prud' Homme à Dôme C

Le Programme « *Micrométéorites @ Dôme C* »

Dôme C, Janvier 2000

Neige de surface

(0-80 cm) @ 3 km du camp

Dôme C, Janvier 2002

Tranchée 3-4 mètres

$V = 11 \text{ m}^3$

Dôme C, Janvier 2006

Tranchée 4-5 mètres

$V = 25 \text{ m}^3$

La fonte et la filtration

Le fondoir

Les filtres de 30 µm sont analysés après chaque collecte pour contrôler les contaminations terrestres

Les différents types de poussières extraterrestres

CONCORDIA # 03-26-15

CONCORDIA # 03-26-43

CONCORDIA # 03-26-49

CONCORDIA # 03-26-49

Identiques à celles découvertes par M. Maurette, pionnier de cette recherche au Groenland puis sur les côtes Antarctiques .

À la recherche de grains friables...

CONCORDIA Collection

Grain cométaire (NASA)

Les Micrométéorites Ultracarbonées

- Des teneurs en Carbone très élevées
[C] = 50-85 vol%
- Des enrichissement extrêmes en Deutérium
D/H = 10-30 x celui des océans

Similaires aux grains CHON identifiés dans la comète 1P/Halley

Les premières phases minérales du Système Solaire

HH 30
Télescope Hubble
 $V = 500\,000 \text{ km/h}$
Disk = $64 \cdot 10^9 \text{ km} = 500 \text{ UA}$

Les micrométéorites CONCORDIA

nous apportent des informations sur
les premiers millions d'années
après la naissance du Soleil...

La station FIB au CSNSM (Focus Ion Beam)

2/2/2005	Mag	WD	Spot	HV	VacMode	Det	20.0 μm
3:39:31 PM	2500x	11.2 mm	3.0	20.0 kV	Low vacuum	LFD Stub 2 Murchison Grain B S

Beam	pA	Mag	Tilt	HFV	02/08/05	20 μm
30.0 kV	105	2.50 kX	0.0°	122 μm	15:15:32

Beam	pA	Mag	Tilt	HFV	02/08/05	5 μm
30.0 kV	13.0	15.0 kX	0.0°	20.3 μm	15:49:27

Beam	pA	Mag	Tilt	HFV	02/08/05	5 μm
30.0 kV	106	10.0 kX	0.0°	30.4 μm	15:51:09	

Spectroscopie de Masse CSNSM ORSAY

The **IMS-Orsay** ion micro-probe

Micrometeorites *in-situ* isotopic analysis

Engrand et al, 1999

Merci pour votre attention!