Développement de la tomographie couleur intra-vitale basée sur la caméra à pixels hybrides XPAD3

Carine Kronland-Martinet
Séminaire Doctorants
Mercredi 28 Novembre 2012

Objectif : Caractérisation simultanée de la vascularisation et de l'inflammation dans les tumeurs cérébrales chez la souris

Plan

1. Dispositif expérimental

1.1. La caméra XPAD3

1.2. Le prototype d'imageur Pixscan II

2. Déroulement de la thèse

2.1. Démonstration et validation du principe de l'imagerie spectrale

2.2. Amélioration de la qualité des images

2.3. Applications biologiques prévues

1.1. LA CAMERA XPAD3

- Détecteur à pixels hybrides issus de l'expérience ATLAS
- 500 000 pixels, $130 \times 130 \mu\text{m}$
- Chaque pixel possède sa propre électronique de lecture
 - Pas de bruit de courant noir
- Comptage de photons
 - Haut signal/bruit
- Seuillage en énergie
 - Sélection des photons d'énergie supérieure à une consigne

XPAD3

→ **Imagerie X à basses statistiques, meilleur que le CCD**

1.2. LE PIXSCAN II

→ Micro-scanner à rayons X qui incorpore la caméra XPAD3

- Travail à basses statistiques
 - Réduction de la dose
- Grande dynamique de comptage
 - Contraste étendu
- Seuils en énergies
 - Augmentation de la sensibilité de détection des agents de contraste
 - Identification et séparation de plusieurs agents de contrastes injectés simultanément

→ Nouveau type d'imagerie dite SPECTRALE

2. OBJECTIF DE THESE

- Faisabilité de la tomographie multi-spectrale basée sur la caméra XPAD3 chez le petit animal
- Dans un contexte tumoral, il s'agira de visualiser :
 - L'iode injecté en intraveineuse pour marquer le système vasculaire
 - Les nanoparticules d'argent capturées par les macrophages comme marqueurs d'inflammation

2.1.1. Démonstration de l'imagerie spectrale

- Acquisitions multi-seuillées autour du K-edge de l'agent de contraste

2.1.1. Démonstration du principe de l'imagerie spectrale

- Acquisitions multi-seuillées autour du K-edge de l'agent de contraste

2.1.1. Démonstration du principe de l'imagerie spectrale

- Acquisitions multi-seuillées autour du K-edge de l'agent de contraste

2.1.1. Démonstration du principe de l'imagerie spectrale

- Acquisitions multi-seuillées autour du K-edge de l'agent de contraste

2.1.1. Démonstration du principe de l'imagerie spectrale

- Acquisitions multi-seuillées autour du K-edge de l'agent de contraste

Rehaussement de contraste

2.1.1. Démonstration du principe de l'imagerie spectrale

- Acquisitions multi-seuillées autour du K-edge de l'agent de contraste

Identification et séparation

2.1.1. Démonstration du principe de l'imagerie spectrale

- Acquisitions multi-seuillées autour du K-edge de l'agent de contraste

Identification et
séparation

2.1.2. Validation du principe de l'imagerie spectrale : 2D

→ Isolation des agents de contraste indépendamment des uns des autres

2.1.2. Validation du principe de l'imagerie spectrale : 3D

→ Isolation des compartiments qui contiennent les agents de contraste

2.1.2. Validation du principe de l'imagerie spectrale : Petit animal 3D

→ Isolation de l'organe qui contient l'agent de contraste

2.2. Amélioration de la qualité des images

Identification du problème d'artéfacts circulaires

Sinogramme d'un demi-cylindre simulé

Reconstruction d'un demi-cylindre simulé

Artéfacts circulaires dus :

- Variabilité de réponse entre pixels
- Changement de composition spectrale

Etablissement des abaques de correction

- Choix d'un objet :
 - Connue
 - Uniforme
 - Epaisseur variable
 - Origine biologique

→ Différentes épaisseurs de papier

Application de la méthode sur des données réelles

Image brute

1^{er} résultat

2.3. Applications biologiques prévues

→ Suivre l'évolution de la vascularisation et de l'inflammation autour d'un glioblastome

Merci de votre attention